

Agramunt 360 (33-14)

Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000

Vegetació potencial

- Carrasca continental: *Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis* (= *infectoriae*)
- Vegetació d'aigua dolça: *Lemmon minoris*, *Potamon*, *Phragmiton communis*, *Molinio-Holcuschoenion*, *Bidenton tripartitae*
- Bosc mixt submontà de carrasca (*Quercus rotundifolia*) i roure de fulla petita (*Quercus faginea*): *Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae*
- Àrees urbanes i àrees denudades artificialment
- Abereda continental: *Rubio tinctorum-Populetum albae*

Vegetació actual

Unitats fisiognòmiques

- 20 Pastures
- 28 Freixe de fulla petita (*Fraxinus angustifolia*)
- 30 Correus
- 37 Roure de fulla petita (*Quercus faginea*) + Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *balota*)
- 40 Altres unitats: roques, zones urbanes, taies forestals
- 50 Matollars
- 51 Carrasca (*Quercus ilex* subsp. *balota*)
- 61 Pollançes (*Populus nigra*, *P. x canadensis*)
- 75 Pi blanc (*Pinus halepensis*)
- 86 Bosc mixt de caducifolis

Unitats de vegetació

- VEGETACIÓ FORESTAL**
- Boscoss escleròfil·les**
- Carrasca continental en materials carbonatats: *Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis*
 - Bosc mixt submontà de carrasca (*Quercus rotundifolia*) i roure de fulla petita (*Quercus faginea*): *Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae*
 - Complexitat del carrascar continental: *Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis* (carrasca) + *Quercetum cocciferae (garriga)* + *Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi* (brola calcícola de romer amb maleda), *Cytiso fontanae-Cistetum clusi coronileosum lotoidei* (brola calcícola termòfila de romer i estepera) + *Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi* (llistonar amb ruda)
- Boscoss caducifolis**
- Abereda amb roja (*Rubia tinctoria*): *Rubio tinctorum-Populetum albae*
 - Complexitat d'abaderia amb roja (*Rubia tinctoria*): *Rubio tinctorum-Populetum albae* + *Rubo unifolii-Corallietum myrtilloae* (paradisa de ròdor) + *Brachypodion phoenicoides* (fenssar)
- Arbredes**
- Pinedes de pi blanc (*Pinus halepensis*) procedents de repoblació sense sotabosc o quasi
 - Plantacions de pollançes (*Populus sp.pl.*) i altres espècies de planifolis
 - Vegetació hidròfica, higrofila, heliòfica i higròfitròfila: *Lemmon minoris* (lentils d'aigua), *Phragmiton* (sentils), *Molinio-Holcuschoenion* (grogneres), *Phragmiton communis* (canysers i bogars)
- VEGETACIÓ HALÒFILA I NITROHALÒFILA**
- Matollars halonitròfils i vegetació halòfils: *Salsola vermiculatae-Artemisietum herbae-abae* (matollars de serral i boidja pudent) + *Frankerion pulverulentae* (vegetació terofítica halòfils)
- VEGETACIÓ ARVENSE I ANTROPOGÈNICA**
- Coneus herbacis extensius de regadiu: *Polygono-Chenopodion polyspermi* (= *Parico-Setarion*)
 - Coneus de frutellers de regadiu: *Polygono-Chenopodion polyspermi* (= *Parico-Setarion*)
 - Coneus de vinyes: *Polygono-Chenopodion polyspermi* (= *Parico-Setarion*)
 - Coneus herbacis extensius de seca: *Romero hybridae-Hypecetum penduli*
 - Coneus llenyosos de seca de terrenys calcàris i argil·losos: *Diploclietum erucoides*
 - Coneus herbacis (*Romero hybridae* (= *Secalio*)) i frutellers de seca (*Diploclietum erucoides*) en transformació a frutellers o coneus herbacis de regadiu (*Polygono-Chenopodion polyspermi* (= *Parico-Setarion*))
 - Camps abandonats i ermsos subnitrofils i nitrofils: *Bromo-Oryzopon mliacae* + *Teniatthero-Aegilopion geniculatae* + *Chenopodion muralis*
- VEGETACIÓ ARBUSTIVA**
- Garrigs: *Quercetum cocciferae*
 - Complexitat de la garriga amb brola de romer i maleda: *Quercetum cocciferae* (garriga) + *Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi* (brola calcícola) + *Cytiso fontanae-Cistetum clusi coronileosum lotoidei* (brola de romer i estepera) + *Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi* (llistonar amb ruda)
 - Brola calcícola: *Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi* (brola de romer i maleda), *Cytiso fontanae-Cistetum clusi coronileosum lotoidei* (brola de romer i estepera) + *Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi* (llistonar amb ruda) + *espertar* (*Delphinio gracilis-Lygetum sparti*)
 - Timoneda gipsícola: *Ononidetum tridentatae* + *Hemario fruticosae-Helianthemum squamali*
 - Complexitat de la timoneda gipsícola: *Ononidetum tridentatae* + *Hemario fruticosae-Helianthemum squamali* + *Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi* (llistonar amb ruda)
- VEGETACIÓ PRADENCA I GRAMENETS**
- Llistonar amb ruda (*Ruto angustifolia*) i matollars halonitròfils: *Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi* (llistonar) + *Salsola vermiculatae-Artemisietum herbae-abae* (matollars de serral i boidja pudent)
 - Espertar i matollars halonitròfils: *Delphinio gracilis-Lygetum sparti* (espertar) + *Salsola vermiculatae-Artemisietum herbae-abae* (matollars de serral i boidja pudent)



Autor del mapa: Joan Pedrol Solanes¹, Josep Antoni Conesa Mor²
Coordenador del mapa: Emper Carrillo Ortuño¹
Base cartogràfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (mapa topogràfic 1:50.000)
Any d'el·leccament: 2014
Any de publicació: 2015
Lectura del mapa: El color de fons indica la vegetació potencial, les etiquetes de color negre corresponen a les unitats de vegetació actual i les vermelles a la fisiognomia.
¹ Departament d'Ortofructicultura, Botànica i Jardineria, Universitat de Lleida
² Grup de Geoecologia i Cartografia de la Vegetació, Departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona.
<http://www.uib.edu/geoveg/>